

## Acétate de Glatiramère : Copaxone®

### Précautions d'emploi et indications

- Sclérose en plaques rémittente (2 poussées dans les 2 années précédentes)
- EDSS  $\leq$  5,5 (marche 100 m sans aide)
- Contraception efficace
- ECG normal

### Posologie

- **1 ampoule SC quotidienne** (dose complète dès la première injection) soit 0,5 ml de solution injectée.
- Lavage au savon et désinfection au Septéal.

### Réalisation

Proposer au patient de venir avec son conjoint pour la technique d'injection.

#### Jour 1 en hôpital de jour :

- Apprentissage de l'injection par l'infirmière
- Surveillance de la tolérance immédiate :
  - Brûlure locale
  - Démangeaison locale
  - Surtout : prévenir de la possibilité très rare d'un malaise général avec oppression thoracique pouvant aller jusqu'à l'impression de mort imminente (exceptionnelle), durant quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes, pouvant survenir avec un délai de **plusieurs minutes**.

#### Jour 2 en hôpital de jour :

- Vérification de l'apprentissage (injection réalisée par le patient ou son conjoint)
- Vérification de la tolérance générale
- Vérification de la tolérance locale

### Traitements associés

Aucun

### Surveillance et précautions

- Aucune biologique
- Prévenir de la possibilité de survenue progressive de petites boules de graisses aux sites d'injection.
- Visite médicale à 1 mois puis 3 mois.