

# Acétate de glatiramère : Copaxone®

## Précautions d'emploi et indications

- Sclérose en plaques récurrente-rémittente (2 poussées dans les 2 années précédentes)
- Syndrome cliniquement isolé à haut risque de confirmer une SEP
- EDSS  $\leq$  5,5 (marche 100 m sans aide)
- Contraception efficace

## Posologie

- **1 seringue pré-remplie SC quotidienne** (dose complète dès la première injection) soit 1 ml (20 mg) de solution injectée

## Réalisation

Proposer au patient de venir avec son conjoint pour la technique d'injection.

### A l'hôpital :

- ECG
- Apprentissage de l'injection par l'infirmière avec auto-injecteur
- Désinfection du site d'injection avec antiseptique de préférence sans alcool
- Surveillance de la tolérance immédiate :
  - Brûlure locale
  - Démangeaison locale
  - Surtout : prévenir de la possibilité très rare d'un malaise général avec oppression thoracique pouvant aller jusqu'à l'impression de mort imminente (exceptionnelle), durant quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes, pouvant survenir avec un délai de **plusieurs minutes**.

## Traitements associés

Aucun

## Surveillance et précautions

- Aucune biologique
- Prévenir de la possibilité de survenue progressive de petites boules de graisses aux sites d'injection
- Visite médicale à 1 mois puis 3 mois